CANAL PRINCIPAL

Representa el ambiente más caudaloso del Río Paraná. En esta pecera vas a encontrar a los peces de mayor tamaño dentro del acuario. Entre ellas el sábalo que representa el 60% de la ictiomasa (la cantidad total de peces) del río Paraná y se alimenta de detritos (restos de materia que se depositan en el fondo del río). Estos detritos tienen muy baja calidad nutricional pero luego de ser metabolizados, hacen de la carne del sábalo, un producto de calidad, siendo la base de la pirámide alimentaria del río. En cambio, especies como el surubí y el dorado se encuentran en la cima de la pirámide alimentaria.

En el río Paraná, se registraron dos especies de surubíes: el surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) y el surubí atigrado (Pseudoplatystoma reticulatum). Son cazadores, principalmente ictiófagos, alimentándose de peces más pequeños. Pueden alcanzar grandes tamaños, superando los 80 kg y el metro y medio de longitud.

ARMADO COMÚN

Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821c)

Es un pez de gran tamaño que puede alcanzar los 700 mm de longitud y los 4500 g de peso. El cuerpo es elongado y se observa en los flancos una serie de escudos óseos. La cabeza es deprimida, más ancha que larga, y la boca es redondeada. Bordeando la boca se encuentran las barbillas maxilares y mentonianas. La aleta adiposa es corta. La aleta dorsal tiene una espina osificada y muy fuerte. La espina pectoral también está osificada y aserrada en ambos lados. El patrón de coloración es pardo con motas más oscuras sobre el cuerpo y las aletas.

Es omnívoro. Se alimenta de frutos, crustáceos, moluscos y diversos animales y vegetales.

Se encuentra en la cuenca de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Río de la Plata.

Tiene un particular interés en la pesca comercial y deportiva.

Esta especie es ovípara.

Estado de conservación: No evaluado. (Ref. CITES, IUCN).

ACUARIO DEL RÍO PARANÁ
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

PROVINCIA DE SANTA FE

SURUBÍ PINTADO

Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829)

Es una de las especies de mayor tamaño del orden Siluriformes, sólo superada por el Manguruyú (Zungaro jahu). Alcanza los 2000 mm de longitud. El cuerpo es largo, la cabeza es grande y muy deprimida. La boca es amplia, su ancho es aproximadamente igual al ancho de la cabeza. Posee barbillas maxilares y mentonianas. La aleta dorsal se ubica más cerca del extremo del hocico que de la base de la caudal. La aleta adiposa es corta. El color de fondo es pardo amarillento oscuro en el dorso y el es vientre blanco. Posee manchas circulares pardo oscuras dispersas en el cuerpo y aletas.

Es una especie netamente piscívora.

Posee una amplia distribución en Argentina que incluye la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y Río de la Plata.

Se recomienda seguimiento de la evolución teniendo en cuenta las diversas amenazas: fragmentación del hábitat, disminución de la calidad de ambiente, presión pesquera (comercial y deportiva), etc. Se debe prestar especial atención debido a su estatus ecológico (predador tope).

Es ovíparo con fecundación externa. Su carne es de excelente calidad, y a diferencia del Dorado (Salminus brasiliensis) su comercialización está permitida en Entre Ríos y Corrientes.

Estado de conservación: No evaluado. (Ref. CITES, IUCN).

ACUARIO DEL RÍO PARANÁ
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

PROVINCIA DE SANTA FE

TAPE

Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1835)

Es un bagre con el cuerpo alto que puede alcanzar los 350 mm de longitud. La cabeza es grande, más ancha que larga. La boca es amplia y contiene dientes pequeños. Alrededor de la boca posee un par de barbillas maxilares y dos pares de barbillas mentonianas. La aleta adiposa es corta y baja y está muy separada de la dorsal. La aleta caudal tiene el lóbulo inferior un poco más largo que el superior. El color es pardo con fajas transversales irregulares pardo oscuro que llegan hasta el final del cuerpo.

Es carnívoro. Se alimenta de peces más pequeños, camarones y otros invertebrados acuáticos.

Se distribuye en la cuenca de los ríos Uruguay, Paraná, Paraguay y Río de la Plata.

Si bien es apreciado en pesca comercial o deportiva, su captura suele ser casual y poco frecuente, incluso confundiéndose con el Manguruyú (Zungaro jahu), con el cual ni siquiera comparten familia.

Es ovíparo con fecundación externa.

Estado de conservación: No evaluado. (Ref. CITES, IUCN).

RAYA NEGRA

Potamotrygon amandae (Laboda & Carvalho, 2013)

Tiene forma ovalada, el ojo es pequeño. La cola es más corta que el largo del cuerpo y posee una o más espinas aserradas en la línea media dorsal y varias hileras de espinas a los lados.
El dorso es pigmentado, el color de fondo es oscuro entre pardo y negro con pequeñas manchas irregulares que no superan el diámetro del ojo y tiene coloración anaranjada bordeada de gris. La superficie ventral es gris excepto en la zona de cabeza y las aberturas branquiales, que es blanca.

Es carnívoro. Puede ingerir crustáceos, moluscos, pequeños insectos y peces.

Se distribuye en Argentina, en la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay.

Permanece cerca de la superficie del agua en sectores cercanos a la costa, batiendo las aletas. Es un mecanismo mediante el cual intenta llevar el agua superficial rica en oxígeno hacia las branquias en momentos en que el ambiente posee baja concentración de este elemento.

Estado de conservación: No evaluado. (Ref. CITES, IUCN).

ACUARIO DEL RÍO PARANÁ
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

PROVINCIA DE SANTA FE

SURUBÍ ATIGRADO

Pseudoplatystoma reticulatum (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Esta especie puede alcanzar los 1400 mm de longitud. El cuerpo es largo y delgado. La cabeza es grande, muy deprimida y de ancho uniforme. La boca es amplia, su ancho es aproximadamente igual al ancho de la cabeza. Bordeando la boca se encuentran las barbillas, un par de maxilares y dos pares de mentonianas.
El color de fondo es verde oliva con bandas transversales oscuras que llegan al vientre. La parte inferior del flanco y el vientre son blancos con unas pocas manchas oscuras. Las aletas son pardo-claras con motas redondas.

Es piscívoro. Se alimenta de peces.

Tiene una amplia distribución en Argentina que incluye las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

Es una especie menos abundante y no tan ampliamente distribuida como su congénere P. corruscans, sin embargo el interés en pesca deportiva y comercial es el mismo por que los métodos de captura no son selectivos entre ambos, haciendo mas notorio el riesgo poblacional.

Es ovíparo de fecundación externa. Su carne es de excelente calidad, y su consumo y comercialización están permitidos en Corrientes y otras provincias de Argentina. Está prohibida su captura en la Provincia de Entre Ríos.

Estado de conservación: No evaluado. (Ref. CITES, IUCN).